

Příbalová informace: informace pro uživatele

Decapeptyl depot 3,75 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

triptorelin

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci :

1. Co je přípravek Decapeptyl depot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Decapeptyl depot používat
3. Jak se přípravek Decapeptyl depot používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Decapeptyl depot uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Decapeptyl depot a k čemu se používá

Tento přípravek obsahuje triptorelin (ve formě triptorelin-acetátu), což je syntetická látka podobná přirozenému gonadotropin uvolňujícímu hormonu (GnRH). V organismu působí tak, že snižuje hladiny určitých pohlavních hormonů.

Přípravek se používá:

Muži:

- pokročilá rakovina prostaty, při které je potřeba potlačit tvorbu mužského pohlavního hormonu – testosteronu
- vyšetření hormonální citlivosti karcinomu prostaty

Ženy:

Na potlačení tvorby hormonů produkovaných vaječníky:

- na zmenšení velikosti myomů (symptomatické děložní myomy, děložní myomy spojené se sterilitou nebo infertilitou a výskyt myomů v mladém věku).
- při léčbě symptomatické, laparoskopicky ověřené endometrióze (přítomnost částeček výstelky dutiny děložní mimo dělohu). Léčba je vhodná i před plánovanou endoskopickou chirurgickou léčbou.
- při metodách asistované reprodukce (umělé oplodnění) jako doplňková léčba na vyvolání ovulace za účelem umělého oplodnění a přenosu embrya.

Děti:

- léčba prokázané centrální pubertas praecox (puberta, která nastává předčasně a je doprovázená tělesnými a hormonálními změnami).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Decapeptyl depot používat

Nepoužívejte přípravek Decapeptyl depot

- jestliže jste alergický(á) na triptorelin-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na GnRH (gonadotropin uvolňující hormon) nebo analoga GnRH

Ženy

- během těhotenství a v období kojení

Upozornění a opatření

U pacientů používajících přípravek Decapeptyl depot byly hlášeny případy deprese, která může být závažná. Pokud používáte Decapeptyl depot a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Muži:

Sdělte svému lékaři:

- jestliže trpíte bolestí kostí nebo poruchou močení
- jestliže trpíte kompresí míchy nebo obstrukcí močové trubice
- jestliže jste po kastraci
- při zvýšeném riziku onemocnění srdce jako je zvýšený tlak krve nebo problémy se srdečním rytmem

Informujte svého lékaře v případě, že dojde ke zhoršení příznaků onemocnění.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte něčím z následujícího:

Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto onemocnění. Při používání přípravku Decapeptyl depot může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Ženy:

Sdělte svému lékaři:

- jestliže krvácíte během cyklu (s výjimkou prvních měsíců léčby)
- jestliže hrozí zvýšené riziko osteoporózy (například snížená hustota kostních minerálů)

Léčba přípravkem Decapeptyl depot po dobu delší než šest měsíců může vést ke snížení hustoty kostních minerálů. Z tohoto důvodu léčba nemá být delší než šest měsíců. Po ukončení léčby dochází během 6 – 9 měsíců k obnově ztracené kostní tkáně. Zvláštní pozornost má proto být věnována pacientkám se zvýšeným rizikem osteoporózy.

Během léčby

- používejte nehormonální antikoncepční prostředky první měsíc po první injekci a dále pak 4 týdny po poslední injekci až do nástupu menstruace.
- Menstruace ustane. Po ukončení léčby dojde k obnově menstruace během 7 – 12 týdnů po poslední injekci.
- informujte svého lékaře, jestliže menstruace během léčby přetrvává.

Při asistované reprodukci (umělé oplodnění)

Informujte ihned svého lékaře pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou bolest břicha, zvětšení objemu břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, nárůst tělesné hmotnosti, dýchací obtíže a snížené močení.

Tyto příznaky mohou být projevem vysoké aktivity vaječnicků (ovariální hyperstimulační syndrom OHSS), které se mohou stát závažné. Pokud se tyto příznaky stanou závažnými, musí být léčba neplodnosti přerušena a musíte být léčena v nemocnici.

Děti

Poradte se svým lékařem:

Jestliže Vaše dítě trpí silnou nebo opakovanou bolestí hlavy, problémy se zrakem a ušním šelestem, okamžitě kontaktujte lékaře (viz bod 4).

Na počátku léčby má být věk dívek nižší než 9 let a chlapců nižší než 10 let

Po ukončení léčby dojde k rozvoji charakteristických znaků puberty. U většiny dívek začíná menstruace v průměru rok po ukončení léčby a je ve většině případů pravidelná.

Další možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v bodě 4.

Další léčivé přípravky a Decapeptyl depot

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Decapeptyl depot a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) se mohou navzájem ovlivňovat. Decapeptyl depot může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je používán s dalšími přípravky (např: metadon (používaný k úlevě od bolesti nebo jako část odvykací léčby), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Opatrnost je na místě tam, kde je triptorelin podáván současně s léky, které ovlivňují hypofyzární sekreci gonadotropinů.

Těhotenství a kojení

Poradte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek Decapeptyl depot se nesmí používat během těhotenství a v období kojení (viz bod 2 „Nepoužívejte přípravek Decapeptyl depot“).

Během léčby používejte nehormonální antikoncepční prostředky jako prevenci otěhotnění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Avšak pokud během léčby pociťujete závratě, ospalost a poruchy vidění, může být schopnost řídit a obsluhovat stroje zhoršená.

Pokud pociťujete některý z těchto nežádoucích účinků, neřídte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Decapeptyl depot obsahuje polysorbát

Tento léčivý přípravek obsahuje 10,4 mg polysorbátu 80 v jedné dávce, což odpovídá 0,4 mg/den.

Polysorbáty mohou způsobit alergické reakce. Informujte svého lékaře, pokud máte Vy nebo Vaše dítě jakékoli alergie.

3. Jak se přípravek Decapeptyl depot používá

Vždy používejte přípravek Decapeptyl depot přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V závislosti na typu onemocnění, na které se léčíte, dostanete potřebnou dávku injekčně buď subkutánně (pod kůží) nebo intramuskulárně (do svalu).

Muži:

Obvykle se podává jedna injekce přípravku Decapeptyl depot každé 4 týdny. Léčba je dlouhodobá.

Ženy:**Děložní myomy a endometrióza**

Obvykle se podává jedna injekce přípravku Decapeptyl depot každé 4 týdny po dobu ne delší než 6 měsíců.

Léčba se musí zahájit během prvních 5 dní den menstruace.

Asistovaná reprodukce (umělé oplodnění)

Aplikuje se jednorázově, obvykle 2.-3. den cyklu (folikulární fáze) nebo 22. den cyklu (luteální fáze).

Děti:

Na začátku léčby se v nultém, čtrnáctém a osmadvacátém dni podá 1 injekční stříkačka. Dávkování se řídí tělesnou hmotností. Dětem o tělesné hmotnosti pod 20 kg se aplikuje dávka 1,875 mg triptorelinu (poloviční dávka), dětem o tělesné hmotnosti 20 kg až 30 kg se aplikuje dávka 2,5 mg (2/3 plné dávky) a dětem o tělesné hmotnosti nad 30 kg se aplikuje dávka 3,75 mg triptorelinu (plná dávka). Poté se aplikuje po jedné injekci každé další 4 týdny.

Lékař bude kontrolovat délku Vaší léčby nebo délku léčby Vašeho dítěte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Decapeptyl depot, než jste měl(a)

Vzhledem k způsobu balení a lékové formě se neočekává předávkování triptorelinem.

Jestliže se tak stane, informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Decapeptyl depot

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Decapeptyl depot

Léčba přípravkem Decapeptyl depot má být přerušena pouze pod dohledem lékaře. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Decapeptyl depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obecně:

V případě otoku obličeje, rtů, úst nebo krku, které může způsobit potíže při polykání nebo dýchání kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Během léčby agonisty LHRH byly hlášeny případy zvětšení již existujícího adenomu hypofýzy (nezhoubný, pomalu rostoucí nádor předního laloku podvěsku mozkového), nicméně tyto případy nebyly pozorovány při léčbě triptorelinem.

Muži:

Na počátku léčby se v důsledku zvýšení hladin testosteronu mohou zhoršit příznaky onemocnění např. bolesti v kostech nebo jejich zhoršení, obstrukce močové trubice, komprese míchy, svalová slabost a otok dolních končetin, slabost a brnění chodidel a rukou.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

V pozdější fázi léčby se mohou vyskytnout potíže spojené s poklesem hladiny pohlavních hormonů jako jsou např. snížení libida a potence, návaly horka, bolest kostí a obtížné a bolestivé močení.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Alergické reakce, deprese, změny nálady, poruchy spánku, bolest hlavy, pocit na zvracení, nadměrné pocení, bolest svalů a kloubů, gynekomastie (zvětšení prsní žlázy u mužů), únava, reakce v místě vpichu, bolest v místě vpichu, podrážděnost.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Anafylaktické reakce, snížená chuť k jídlu, embolie, zvýšení krevního tlaku, zhoršení astmatu, bolest v horní části břicha, sucho v ústech, snížený růst ochlupení, vypadávání vlasů, atrofie varlat, zvýšení enzymu laktátdehydrogenázy v krvi, zvýšení hladin jaterních enzymů, snížení/zvýšení tělesné hmotnosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

zánět nosohltanu, zvýšená chuť k jídlu, dna, cukrovka (diabetes mellitus), nespavost, deprese, zmatenost, snížená aktivita, ztráta libida, euforická nálada, úzkost, závrať, pocit brnění, píchání nebo znečitlivění, poruchy paměti, porucha chuti, ospalost, porucha řeči, abnormální citlivost oka, poruchy vidění, rozmazané vidění, ušní šelest, porucha rovnováhy - závrať, nízký krevní tlak, dušnost, těžká dušnost, krvácení z nosu, žaludeční potíže, zácpa, průjem, zvracení, nadýmání břicha, žaludeční křeče, akné, svědění, vyrážka, puchýře, angioedém (otok podkoží), kopřivka, nachové zabarvení kůže, bolest v zádech, svalová a kostní bolest, bolest končetin, svalové křeče, svalová a kostní ztuhlost, svalová slabost, ztuhlost a otoky kloubů, osteoartróza (nezánětlivé onemocnění kloubů), bolest prsů, bolest varlat, problémy s ejakulací, tělesná slabost, otok, bolest, třesavka, bolest na hrudi, onemocnění podobné chřipce, horečka, malátnost, zvýšené hodnoty některých enzymů ovlivňující funkci jater a ledvin, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tělesné teploty, EKG změny (prodloužení QT intervalu).

Ženy:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

Snížené libido, náladovost, poruchy spánku, bolest hlavy, návaly horka, bolest břicha, bolest kostí, nadměrné pocení, vaginální krvácení/špinění, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost), bolest při pohlavním styku, bolestivá menstruace, zvětšení vaječníků, bolest v oblasti páneve, slabost.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Alergické reakce, pocit na zvracení, bolest svalů a kloubů, únava, bolest v místě vpichu, reakce v místě vpichu, podrážděnost, změny nálady, deprese.

Méně časté nežádoucí účinky, které postihují 1 až 10 pacientů z 1 000 léčených pacientů:

Anafylaktická reakce, poruchy vidění, pocit mravenčení, svědění, vyrážka, bolest zad, prodloužená a/nebo nepravidelná menstruace, ovariální cysty, vaginální výtok, zvýšený cholesterol, zvýšení hladin některých jaterních enzymů, zvýšení tělesné hmotnosti.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Stavy zmatenosti, úzkost, závratě, rozmazané vidění, porucha rovnováhy, dušnost, průjem, zvracení, žaludeční potíže, angioedém (otok podkoží), kopřivka, onemocnění kostí, svalové křeče, svalová slabost, bolest prsů, silná menstruace, chybění menstruace, ovariální hyperstimulační syndrom, zarudnutí/zánět v místě vpichu, horečka, malátnost, zvýšení krevního tlaku, snížení tělesné hmotnosti.

Děti:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Změny nálady, deprese.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Anafylaktická reakce, pocit na zvracení, zvracení, vaginální krvácení nebo výtok.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Alergické reakce, emoční labilita, nervozita, bolest hlavy, rozmazané vidění, poruchy vidění, idiopatická intrakraniální hypertenze (zvýšený nitrolební tlak charakterizovaný bolestí hlavy, dvojitým viděním a dalšími příznaky týkajícími se vidění, a ušním šelestem), návaly horka, krvácení z nosu,

dušnost, žaludeční potíže, bolest břicha, vyrážka, angioedém (otok podkoží), kopřivka, vypadávání vlasů, červené zbarvení kůže, poškození růstové zóny dlouhých kostí, bolest svalů, bolest kloubů, krvácení z genitálií, bolest, malátnost, bolest a reakce v místě vpichu, zvýšení krevního tlaku, zvýšení tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Decapeptyl depot uchovávat

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C), chránit před mrazem.

Pro transport (např. z lékárny k lékaři) použijte chladicí obal.

Přípravek Decapeptyl depot nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravená suspenze má trvanlivost 3 minuty, je určena k okamžité aplikaci.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Decapeptyl depot obsahuje

1 předplněná injekční stříkačka s práškem (mikrotobolky) obsahuje:

- Léčivá látka: Jedna injekční stříkačka obsahuje 3,75 mg triptorelinu (ve formě 4,12 mg triptorelinacetátu)
- Pomocnými látkami jsou:
 - Polyglaktin (1 : 1)
 - Propylenglykol-dioktanodidekanoát

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml rozpouštědla obsahuje:

Polysorbát 80
Dextran 70
Chlorid sodný
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Roztok hydroxidu sodného 1mol/l
Vodu pro injekci

Jak přípravek Decapeptyl depot vypadá a co obsahuje toto balení

Předplněná injekční stříkačka s práškem (bílé až světle žluté mikrotobolky) a předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem (čirá bezbarvá tekutina), obě injekční stříkačky ze skla třídy I, uzavřené pryžovými zátkami, 2 injekční jehly (pro s.c. nebo i.m. podání), Luer lok spojovací díl, vše zatavené v PE blistru

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce:

Ferring GmbH, Kiel, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci:

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 3. 2025

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


NÁVOD K POUŽITÍ



Důležité informace:

1. Uchovávejte balení přípravku Decapeptyl depot v chladničce.
2. Zajistěte, aby byl Decapeptyl depot injikován do 3 minut od rekonstituce.

Přehled částí přípravku Decapeptyl depot:



1. Příprava


Pro zajištění správné přípravy suspenze musí být striktně dodržovány následující pokyny:

(A)

- Vyjměte balení Decapetyl depot z chladničky.
- Otevřete obal konektoru a vyjměte konektor.



Dbejte, abyste se nedotkli závitů v konektoru.




(B)

- Otočením otevřete uzávěr injekční stříkačky s práškem. Držte injekční stříkačku špičkou směrem nahoru, abyste zabránili vysypání prášku.



Dávejte pozor, abyste nestlačili injekční píst.




(C)

- Našroubujte nadoraz injekční stříkačku s práškem na jeden ze závitů v konektoru.



Před připojením injekční stříkačky s rozpouštědlem vždy připojte ke konektoru stříkačku s práškem.




(D)

- Otočením otevřete uzávěr injekční stříkačky s rozpouštědlem. Držte injekční stříkačku špičkou směrem nahoru, abyste zabránili vylití kapaliny.




Dávejte pozor, abyste nestlačili injekční píst.



(E)

- Našroubujte nadoraz injekční stříkačku s rozpouštědlem na druhý závit v konektoru.



POKRAČOVÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ OTOČTE




Pokud dojde k úniku prášku nebo kapaliny, je třeba přípravek zlikvidovat a nesmí být pacientovi podán.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

2. Rekonstituce

Pro namíchání suspenze:


- Vstříkněte veškerou tekutinu do injekční stříkačky s práškem.
- Pomalu zatlačte suspenzi dozadu a dopředu do dvou stříkaček, dokud nebude homogenně mléčně bílá až slabě žlutá. Dávejte pozor, abyste injekční stříkačky drželi rovně; neohýbat.




$\frac{1}{2}$ nebo $\frac{2}{3}$ dávky pro děti:

Pomocí indikátorů dávky na konektoru naměřte dávky $\frac{1}{2}$ nebo $\frac{2}{3}$:

- Ujistěte se, že suspenze je v injekční stříkačce připojené ke straně konektoru **bez** indikátorů dávky.
- Otočte stříkačky do svislé polohy tak, aby stříkačka obsahující suspenzi byla nahoře.
- Počkejte několik sekund, než se pěna oddělí.
- Pomalu táhněte injekční píst prázdné stříkačky dolů, dokud suspenze nedosáhne indikátoru $\frac{1}{2}$ nebo $\frac{2}{3}$.



$\frac{1}{2}$ DÁVKA



$\frac{2}{3}$ DÁVKA

3. Injekce

- Odšroubujte stříkačku se suspenzí připravenou k injekci z konektoru.
- Našroubujte injekční jehlu na stříkačku.
- Vstříkněte suspenzi do 3 minut.



Decapetyl depot je určen pouze k jednorázovému použití a veškerá nepoužitá suspenze má být zlikvidována.